



02015611312020016



20525

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1561

13 Δεκεμβρίου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δρων συστατικό methamidophos ως προς το φάσμα δράσης 1
- Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δρων συστατικό proyzamide 50% σε μορφή WP, ως προς το φάσμα δράσης 2
- Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δρων συστατικό dicofol ως προς το φάσμα δράσης 3
- Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δρων συστατικό methomyl ως προς το φάσμα δράσης .. 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 106886 (1)
Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δρων συστατικό methamidophos ως προς το φάσμα δράσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. ε, στ και ιζ) και 22 (παρ. ία).
- Την 97252/21-5-99 (ΦΕΚ 1240/Β/16-6-99) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στην «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Υπ. Απόφασης 352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής

λευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Την 80846/18-7-96 (ΦΕΚ 692/Β/19-8-96 κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στην «Τροποποίηση και συμπλήρωση των Παραρτημάτων I και II της Υπ. Απόφασης 352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 95/38/ΕΚ και 95/61/ΕΚ του Συμβουλίου».

4. Την 352654/10.5.95 (ΦΕΚ 518/Β/15-6-95) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στα «Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ».

5. Το από 8-3-2000 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΠΚΠΦ & ΠΕ Πειραιά.

6. Την 399580/30-10-2001 (ΦΕΚ 1479/Β) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη», αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των γεωργικών φαρμάκων, που περιέχουν σαν δραστικό συστατικό methamidophos, ως προς τον τρόπο και το πεδίο εφαρμογής, (σημείο 13 και 23) και προς τούτο παραθέτουμε τις αλλαγές που αφορούν τα σκευάσματα με δρων συστατικό methamidophos καθώς και τα σημεία 13 και 23, ως εξής:

α) Απαγορεύουμε την χρήση τους στις καλλιέργειες: αμυγδαλιάς, πιπεριάς και κρεμμυδιού.

β) Οι εγκρίσεις στις κάτωθι καλλιέργειες τροποποιούνται ως εξής:

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		kg δ.ο./εκατόλιτρο	kg δ.ο./στρέμμα	
Μηλοειδή Αχλαδιά Μηλιά	<ul style="list-style-type: none"> - Καρπόκαγα (Cydia spp.) - Γεωμέτρης (Geometris spp.) - Οπλοκάμπη (Hoplocampa spp.) - Ψύλλα (Psylla pyri) - Τετράνυχτοι (Tetranychus sp., Panonychus ulmi) - Αφίδες (Aphis sp.) 	0,06-0,08	0,12	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 56 ημέρες.
Πυρηνόκαρπα Ροδάκινα (συμπεριλαμβανομένων και νεκταρινιών)	<ul style="list-style-type: none"> - Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) - Τετράνυχτοι (Tetranychus sp.) 	0,05-0,06	0,075	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 56 ημέρες.
Λαχανικά Τομάτα, Μελιτζάνα	<ul style="list-style-type: none"> - Αφίδες (Myzus persicae) - Θρίπες Τετράνυχτοι (Tetranychys urticae T.turkestani) - Αγρότιδες ή Καραφατμέ (Agrotis segetum) - Προντένια (Prodenia 	0,04-0,06	0,09	Εως τρεις εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		kg δ.ο./εκατόλιτρο	kg δ.ο./στρέμμα	
	litura) - Πιερίδα (Pieris brassicae) -Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Λάφυγμα (Laphygma exigua)			
Λάχανο	- Αφίδες (Myzus persicae) -Θρίπες Τετράνυχτοι (Tetranychys urticae T.turkestani) Αγρότιδες ή Καραφατμέ (Agrotis segetum) - Προντένια (Prodenia litura) - Πιερίδα (Pieris brassicae) -Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Λάφυγμα (Laphygma exigua)	0,05	0,036	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.
Κουνουπίδι	- Αφίδες (Myzus persicae) -Θρίπες Τετράνυχτοι (Tetranychys urticae T.turkestani) Αγρότιδες ή Καραφατμέ (Agrotis segetum) - Προντένια (Prodenia litura) - Πιερίδα (Pieris brassicae) -Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Λάφυγμα (Laphygma exigua)	0,06	0,036	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		kg δ.ο./εκατόλιτρο	kg δ.ο./στρέμμα	
Μαρούλι	<ul style="list-style-type: none"> - Αφίδες (Myzus persicae) - Θρίπες Τετράνυχτοι (Tetranychys urticae T. turkestanii) - Αγρότιδες ή Καραφατμέ (Agrotis segetum) - Προντένια (Prodenia litura) - Πιερίδα (Pieris brassicae) - Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Λάφυγμα (Laphygma exigua) 	0,04	0,072	Εως τρεις εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.
Φασόλια (με λοβό)	<ul style="list-style-type: none"> - Αφίδες (Myzus persicae) - Θρίπες Τετράνυχτοι (Tetranychys urticae T. turkestanii) - Αγρότιδες ή Καραφατμέ (Agrotis segetum) - Προντένια (Prodenia litura) - Πιερίδα (Pieris brassicae) - Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Λάφυγμα (Laphygma exigua) 	0,04	0,09	Εως τρεις εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.
Βαμβάκι	<ul style="list-style-type: none"> - Αφίδες (Aphis gossypii) - Αλευρώδης (Bemisia tabaci) - Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Τετράνυχτοι (Tetranychus) 	0,5-1,5	0,15	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		kg δ.ο./εκατόλιτρο	kg δ.ο./στρέμμα	
	urticae) - Θρίπας (Trips tabaci) - Προντένια (Prodenia litura) - Λάφυγμα (Laphygma exigua) - Αιγυπτιακό σκουλήκι (Spodoptera littoralis)			
Πατάτες	- Αφίδες (Myzus persicae) - Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) - Φθοριμαία (Phthorimaea operculella) - Προντένια (Prodenia litura) - Αλτης (Chaetochema tibialis)	0,1-0,2	0,063	Μία έως τρεις εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 21 ημέρες.
Αραβόσιτος	- Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis) - Αφίδες (Aphis gossypii) - Σποντόπτερα (Spodoptera exigua)	0,1	0,08	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 60 ημέρες.
Καπνός	- Αφίδες (Myzus persicae) - Θρίπας (Thrips tabaci) - Αγρότιδες ή Καραφατμέ (Agrotis ypsilon κ.α.) - Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) - Προντένια (Prodenia litura) - Λάφυγμα (Laphygma exigua)	0,04-0,09	0,045-0,06	Εως δύο εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		kg δ.ο./εκατόλιτρο	kg δ.ο./στρέμμα	
Καλλωπιστικά	- Αφίδες (Aphis spp.) - Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae) - Θρίπας (Thrips tabaci) - Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)	-	0,045-0,06	Εως τρεις εφαρμογές. Με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη μετά 14-21 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

-Μηλοειδή	1-2	»
-Πυρηνόκαρπα	1-2	»
-Λάχανο-Κουνουπίδι:	1-2	»
-Λοιπά Λαχανικά:	1-3	»
-Βαμβάκι:	1-2	»
-Πατάτα:	1-3	»
-Αραβόσιτος:	1-2	»
-Καπνός:	1-2	»
-Καλλωπιστικά:	1-3	»

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π) :

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Αραβόσιτος: 60 ημέρες**Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα:** 56 ημέρες**Λοιπές καλλιέργειες:** 21 ημέρες.

Π. Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

Αριθ. 106965

(2)

Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δρων συστατικό propyzamide 50% σε μορφή WP, ως προς το φάσμα δράσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. ε, στ και ιζ) και 22 (παρ. ια).

2. Την 91496/29-3-01 (ΦΕΚ 432/Β/17-4-01) κοινή υπουργική απόφαση όσον αφορά «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Κ.Υ.Α. 352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 00/42/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Την 352654/10.5.95 (ΦΕΚ 518/Β/15-6-95) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά τα «Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και

94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ».

4. Την 2000/42/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της 22-6-2000 «για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικότητας για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επί και εντός των σιτηρών, των τροφίμων ζωικής προέλευσης και ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, αντιστοίχως».

5. Την 399580/30-10-2001 (ΦΕΚ 1479/Β) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη», αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την 158541/26-2-1980 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7094 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KERB WP-50% της εταιρείας ROHM AND HAAS GREECE LTD, που περιέχει σαν δραστικό συστατικό propyzamide 50% σε μορφή WP ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 13) ως εξής:

13. Φάσμα δράσης:

Απαγορεύουμε τη χρήση του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην καλλιέργεια της αραχίδας, και ο Πίνακας του σημείου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		gr. σκ. /στρέμμα	kg δ.ο./εκτάριο	
- Μαρούλι	Πλατύφυλλα και Αγροστώδη ζιζάνια	175-400	0,875-2	1 εφαρμογή Ψεκασμός με δύο τρόπους α) πριν την σπορά ή τη μεταφύτευση και ενσωμάτωση μέσα σε 48 ώρες το αργότερο β) Μετά την σπορά ή την μεταφύτευση και πότισμα Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 30 ημέρες
- Αντίδι	Πλατύφυλλα και Αγροστώδη ζιζάνια	175-400	0,875-2	1 εφαρμογή Ψεκασμός με δύο τρόπους α) πριν την σπορά ή τη μεταφύτευση και ενσωμάτωση μέσα σε

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		gr. σκ. /στρέμμα	kg δ.ο./εκτάριο	
				48 ώρες το αργότερο β) Μετά την σπορά ή την μεταφύτευση και πότισμα Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 30 ημέρες
- Φασόλια		175-300	0,875-1,5	1 εφαρμογή Ψεκασμός με δύο τρόπους α) πριν την σπορά ή τη μεταφύτευση και ενσωμάτωση μέσα σε 48 ώρες το αργότερο β) Μετά την σπορά ή την μεταφύτευση και πότισμα
- Βαμβάκι	Πλατύφυλλα και Αγροστώδη ζιζάνια	300	1,5	1 εφαρμογή Ψεκασμός πριν την σπορά και με ενσωμάτωση μέσα σε 48 ώρες το αργότερο
- Σαχαρότευτλα	Πλατύφυλλα και Αγροστώδη ζιζάνια	250-300	1,25-1,5	1 εφαρμογή Ψεκασμός με 50 λίτρα νερό το στρέμμα, μετά το σταύρωμα των τεύτλων, στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων
- Μηδική	Πλατύφυλλα και Αγροστώδη ζιζάνια	250-300	1,25-1,5	Ψεκασμός με 2-60 λίτρα νερό στο στρέμμα, μετά την πρώτη ή την δεύτερη κοψιά της Μηδικής (Μάιος). Αν μετά τον ψεκασμό ακολουθήσει τεχνητή βροχή, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα

Παρατηρήσεις

Δεν καταπολεμά τα πλατύφυλλα ζιζάνια των οικογενειών Compositae και Leguminosae όπως τα: *Anthemis arvensis* (ανθεμίδα), *Centaurea cyanus* (Κενταύριο), *Galinsoga* spp.

(Γκαλενσόγκα), *Chamomilla vecutita* (Χαμομήλι), *Senecio vulgaris* (Σενέτιο), *Sonchus oleraceus* (Ζωχό), *Trifolium spp* (Τριφύλλια).

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα - SZ:

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ5 Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. Πάρτε αυστηρές προφυλάξεις να μη μολυνθούν γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
- SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.
- SZ11 Μη το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

II. Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

Αριθ. 106966

(3)

Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δρων συστατικό dicofol ως προς το φάσμα δράσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. στ και ιη) και 22 (παρ. ια και ιβ).

2. Την 100866/3-8-01 (ΦΕΚ 1076/Β) ΚΥΑ όσον αφορά την «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της κοινής υπουργικής απόφασης 352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 01/35/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Την 91496/29-3-01 (ΦΕΚ 432/Β/17-4-01) κοινή υπουργική απόφαση όσον αφορά την «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Κ.Υ.Α. 352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 00/42/ΕΚ της Επιτροπής».

4. Την 75040/16.5.97 (ΦΕΚ 466/Β) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στην «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της Κ.Υ.Α. 352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμ-

μάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/32/ΕΚ του Συμβουλίου».

5. Την 352654/10.5.95 (ΦΕΚ 518/Β/15-6-95) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στα «Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ»

6. Το από 27-05-2002 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΠΚΠΦ & ΠΕ Πειραιά.

7. Την 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10. 2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιάλη», αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτόνων) που περιέχουν σαν δραστικό συστατικό dicofol ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 13), καθώς και το σημείο 23 ως εξής:

13. Φάσμα δράσης:

Απαγορεύουμε τη χρήση των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις καλλιέργειες ακροδρύων (αμυγδαλιάς), μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, φράουλας, σέλινου, ψυχανθών, πατάτας, και σακχαρότευτλων και ως εκ τούτου ο Πίνακας του σημείου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

13. Φάσμα δράσης:

Απαγορεύουμε τη χρήση των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις καλλιέργειες ακροδρύων (αμυγδαλιάς), μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, φράουλας, σέλινου, ψυχανθών, πατάτας, και σακχαρότευτλων και ως εκ τούτου ο Πίνακας του σημείου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

Καλλιέργειες	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Αρ. εφαρμογών	PHI
		Χγρ. δρ.ουσ./ στρέμμα	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	Χγρ. δρ.ουσ./ 100 λίτρα νερό			
<u>Εσπεριδοειδή</u>	Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae, Panonychus citri) Παραμορφωτικό άκαρι (Aceria sheldoni) Σκωριόχρωμη κηλίδωση καρπών (Aculus pelekassi) Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, Eriophyidae, Tarsonemidae)	0,08-0,184	200-400	0,04-0,046	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	1	28

Καλλιέργειες	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Αρ. εφαρμογών	PHI
		Χγρ. δρ.ουσ./ στρέμμα	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	Χγρ. δρ.ουσ./ 100 λίτρα νερό			
Αμπέλι (επιτραπέζια & οиноποιήσιμα σταφύλια)	Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) Κοινός τετράνυχος (Tetranychus urticae) Κίτρινος τετράνυχος (Eutetranychus caprini) Φυλλοκόπτης (Phyllocoptes vitis) Ερίνωση (Eriophyes vitis)	0,04-0,046	100	0,04-0,046	Στο στάδιο BBCH 89. Ψεκάσμοι καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών	1	28
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (υπάιθρου): Σολανώδη Τομάτα Κολοκυνθοειδή με εδάδιμο φλοιό αγγούρι κολοκύθι Κολοκυνθοειδή με μη εδάδιμο φλοιό πεπόνι καρπούζι	Τετράνυχος (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus turkestanii) Μπρούτζινη ακαρίωση τομάτας (Aculops lycopersici, Polyphagotarsonemus latus)	0,048-0,072 0,046	100 100	0,048-0,072 0,046-0,065	Ψεκάσμοι καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Στο στάδιο BBCH 72 Στα στάδια BBCH 81-85	1 7 7	15 7
Βαμβάκι	Τετράνυχος	0,046-0,072	100	0,046-0,072	Πριν το άνοιγμα των καρυδιών	1	
Τριφύλλι	Τετράνυχος	0,042-0,052	100	0,042-0,052	Ψεκάσμοι καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	1	
Καλλωπιστικά	Τετράνυχος	0,042-0,052	100	0,042-0,052	Ψεκάσμοι καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.		

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

- Τομάτα: 15 ημέρες,
- Αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι: 7 ημέρες
- Λοιπές καλλιέργειες: 28 ημέρες.

Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

Αριθ. 106967

(4)

Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δρων συστατικό methomyl ως προς το φάσμα δράσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. στ και ιη) και 22 (παρ. ια και ιβ).

2. Την 91496/29-3-01 (ΦΕΚ 432/Β/17-4-01) κοινή υπουργική απόφαση όσον αφορά την «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της κοινής υπουργικής απόφασης

352654/10-5-95 (ΦΕΚ 518/Β/95), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 00/42/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Την 352654/10.5.95 (ΦΕΚ 518/Β/15-6-95) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στα «Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ».

4. Το από 10-12-2001 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΠΚΠΦ & ΠΕ Πειραιά.

5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Εύαγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτόνων) που περιέχουν σαν δραστικό συστατικό το methomyl ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 13) καθώς και τα σημεία 22 και 23 ως εξής:

13. Φάσμα δράσης:

Απαγορεύουμε τη χρήση των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων με ψεκασμούς φυλλώματος στις καλλιέργειες φασολιού, κουνουπιδιού, λάχανου, τριφυλλιού, πατάτας και αραβοσίτου, καθώς επίσης ανακαλούμε την εφαρμογή του σαν δόλωμα με πίτυρα για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους (βλέπε και Φράση Απαγόρευσης), και ο Πίνακας του σημείου 13, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Αρ. εφαρμογών	ΡΗΙ
		γρ. δρ.ουσ./ στρέμμα	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	γρ. δρ.ουσ./ 100 λίτρα νερό			
Εσπεριδοειδή Γκρέιπ-φρούτ Λεμονιά Μανταρινιά Πορτοκαλιά	-Αφίδες (Aphididae), -Ανθοτρήτης (Prays citri), -Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata)	36-124	100-230	36-54	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	1-3	20
Αμυνδαλιά	-Ευρύτομο (Eurytoma sp.)	36-81	100-150	36-54	Μια εφαρμογή κατά την πτώση των πετάλων.	1	Μ.Ε. ¹
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά,	-Καρπόκαψα μηλιάς (Cydia pomonella), -Αφίδες, -Φυλλορύκτες (Lyonetia sp., Phyllonorycter sp.), -Νάρκη (Cemistoma scitella),	36-75	100-140	36-54	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	1-3	20

-Φυλλοδέτης (Cacoecia ή Archips rosana) -Ανάρσια, ή βλαστορύκτης (Anarsia lineatella) -Ματόψειρα ή βαμβακάδα (Eriosoma lanigerum) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Ανθονόμος (Anthonomus sp.)						
--	--	--	--	--	--	--

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Αρ. εφαρμογών	ΡΗΙ
		γρ. δρ.ουσ./ στρέμμα	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	γρ. δρ.ουσ./ 100 λίτρα νερό			
Πυρηνόκαρπα Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσινιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηινιά	-Καρπόκαψα ροδακινιάς (Cydia molesta), -Καρπόκαψα δαμασκηινιάς (Laspeyresia funebrana), -Αφίδες, -Φυλλορύκτες, -Φυλλοδέτης, -Βλαστορύκτης, -Σκαθάρια	36-75	100-140	36-54	Ψεκάσμός με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	1-3	20
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια)	-Ευδεμίδα (Lobesia botrana) -Βαμβακάδα (Planococcus vitis)	18-65	50-120	36-54	Ψεκάσμός με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	1-3	20
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια)		40	50-100	40	Ως άνω	1-2	35
Αμπέλι	-Αυγά ευδεμίδας	10-33	50-120	20-27	Σε πρόγραμμα ψεκασμών νωρίς την άνοιξη με την εμφάνιση των αυγών της πρώτης γενιάς και επανάληψη στις επόμενες γενιές	1-3	35
Ελιά	-Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)	36-81	100-150	36-54	Ένας ψεκάσμός στο στάδιο των καρπών μεγέθους φακής (Ιούνιος)	1	M.E. ¹
Λαχανικά (υπαίθρου και θερμοκηπίου ²) Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Μαρούλι Πεπόνι, Καρπούζι	-Αφίδες, -Θρίπες, (Thrips tabaci) -Πράσινο σκουλήκι, (Heliothis armigera) -Πιπερίδα, (Pieris brassicae) -Μαμέστρα, (Mamestra brassicae) -Σποντόπτερα, (Spodoptera sp.) -Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)	36-45	50-100	36-45	Ψεκάσμός με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή.	1-3	7 " 15 " " 20 "

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Αρ. εφαρμογών	ΡΗΙ
		γρ. δρ.ουσ./ στρέμμα	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	γρ. δρ.ουσ./ 100 λίτρα νερό			
Λαχανικά (υπαίθρου και θερμοκηπίου ²) Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαρούλι Κουνουπίδι, Φασόλι, Λάχανο, Πατάτα	-Υλέμνια (Hylemia antiqua)	225-270			α. Πριν την σπορά ή τη μεταφύτευση: όμοιομορφος ψεκασμός του εδάφους με όσο νερό χρειάζεται για την καλή κατανομή του προϊόντος και αμέσως ενσωμάτωση σε βάθος μέχρι 5 εκ. με φρέζα ή ελαφρύ πότισμα		Μ.Ε. ¹
		72			μετά τη σπορά ή μεταφύτευση τουλάχιστον 4 ημέρες μετά: ψεκασμός του εδάφους και αμέσως ελαφρύ πότισμα ή Πότισμα των λάκκων στη βάση του φυτού με όσο νερό χρειάζεται για να κατέβει το φάρμακο σε βάθος 5 εκ..		
	-Αγρότιδα ή καραφατμέ (Agrotis sp.), -Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa)	225-270			α. Πριν την σπορά ή τη μεταφύτευση: όμοιομορφος ψεκασμός του εδάφους με όσο νερό χρειάζεται για την καλή κατανομή του προϊόντος και αμέσως ενσωμάτωση σε βάθος μέχρι 5 εκ. με φρέζα ή ελαφρύ πότισμα		
		90			β. Τέσσερις (4) μέρες μετά το φύτευμα ή την μεταφύτευση: ψεκασμός του εδάφους με 50-60 λίτρα νερό.		
Βαμβάκι	Αφίδες, (Aphis sp., Myzus sp.) Θρίπες, (Thrips sp.)	23-27	50-80		Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το φύτρωμα μέχρι λίγο πριν φανούν τα πρώτα χτένια	1-4	20
	Αλευρώδης (Bemisia tabaci)	45-72	50-80		Ως άνω		
	Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella)	45-72	50-80		Ψεκασμός όταν βρεθούν 6-8 μικρά σκουλήκια στις κορυφές 100 φυτών την περίοδο που δεν υπάρχουν καρύδια ή 5 μικρά σκουλήκια όταν υπάρχουν καρύδια		

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Αρ. εφαρμογών	ΡΗΙ
		γρ. δρ.ουσ./ στρέμμα	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	γρ. δρ.ουσ./ 100 λίτρα νερό			
	Αυγά πράσινου σκουληκιού	20-27	50-80		Σε πρόγραμμα ψεκασμών κάθε 5-7 μέρες όταν εμφανιστεί σημαντικός αριθμός αυγών		
Καπνός	α) Σπορείο Αφίδες, (Aphis sp., Myzus sp.) Θρίπες, (Thrips sp.) Εντομα εδάφους: αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp.) Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόφτης (Gryllotalpa gryllotalpa) Υλέμνια ή πιτάκι ή πηδούλι (Hylemia antiqua)	2,75/ 10τμ.	-	-	α) Στο σπορείο: τρία ποτίσματα με όσο νερό χρειάζεται για κανονικό πότισμα. 1. Αμέσως μετά τη σπορά 2. Κατά το σταύρωμα 3. 10 ημέρες πριν την μεταφύτευση	1-3	20
	β) Χωράφι κατά την μεταφύτευση Αφίδες, Θρίπες, Εντομα εδάφους ως ανωτέρω	72,5 (μόνο για Μπέρλε ®) 135 (μόνο για Ανατολι κού Τύπου)	-	-	β) Στο χωράφι κατά την μεταφύτευση μία εφαρμογή με το νερό της φυτείας		
	γ) Χωράφι μετά την μεταφύτευση Εντομα εδάφους ως ανωτέρω	90	-	-	γ) Μετά την μεταφύτευση: Ψεκασμός εδάφους στη βάση των φυτών μόλις εμφανιστούν τα έντομα. Ψεκασμοί με καλό λούσιμο των φυτών. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται ανάλογα με την προσβολή		
	Αφίδες, Θρίπες,	36,25- 53,75	-	-			

¹Μ.Ε. Μη Εφαρμόσιμο.²Τα σκευάσματα 90% SP δεν εφαρμόζονται σε λαχανικά θερμοκηπίου

22. Απαγορεύσεις:(Α φράσεις):

– Απαγορεύεται η χρήση του σε δολώματα

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

- Τομάτα, μελιτζάνα: 7 ημέρες

- Πιπεριά, μαρούλι, αγγούρι, κολοκύθι: 15 ημέρες

- Εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, οινοποιήσιμα σταφύλια, πεπόνι, καρπούζι, βαμβάκι, καπνός: 20 ημέρες

- Επιτραπέζια σταφύλια : 35 ημέρες

Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ